



**PROSPECTO PARA EL
PACIENTE**

**C/ Portal de Foronda 54
Vitoria-Gasteiz
01010
Tfno:945009582**

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: ÁCIDO SALICÍLICO Y
TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO, GEL DE**

***Forma farmacéutica:* Gel**

***Vía de administración:* Uso cutáneo**

COMPOSICIÓN:

Ácido salicílico	6,00 g
Triamcinolona acetónido	100,00 mg
<i>Excipientes</i>	
Propilenglicol	60,00 g
Etanol 96 %	6,00 g
Hidroxipropil goma guar	2,00 g
Agua purificada	c.s.p. 100 g

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

El ácido salicílico, a la concentración que se utiliza en esta fórmula, elimina la capa superficial de la piel.

La triamcinolona es un glucocorticoide muy potente, con propiedades antiinflamatorias y antialérgicas.

Esta fórmula se utiliza en el tratamiento de la psoriasis y de la dermatitis del cuero cabelludo.

CONTRAINDICACIONES:

Este medicamento no se debe utilizar en caso de alergia a salicilatos o corticoides.

No debe aplicarse sobre lunares, manchas de nacimiento, verrugas o mucosas (interior de la boca, nariz etc).

PRECAUCIONES:

Se absorbe rápidamente a través de la piel por lo que no se debe emplear en áreas extensas, durante períodos prolongados o sobre piel inflamada o erosionada, debido al peligro de absorción e intoxicación, especialmente en los niños y pacientes con insuficiencia hepática o renal.

En caso de pacientes diabéticos o con problemas de circulación debe aplicarse con mucha precaución en las extremidades.

No se deben utilizar vendajes oclusivos (que impidan la ventilación de la zona), salvo indicación médica.

Se debe evitar el contacto con los ojos y mucosas, si se produjera, se debe lavar la zona con abundante agua durante unos 15 minutos.

No deben utilizarse, salvo por prescripción médica, otros medicamentos que contengan salicilatos (por ej. analgésicos con ácido acetilsalicílico)

Si aparecen signos de infección como dolor, enrojecimiento o pus, consulte con el médico.

INTERACCIONES:

No deben utilizarse, salvo por prescripción médica, otros medicamentos que contengan salicilatos (por ej. analgésicos con ácido acetilsalicílico), ya que, aunque es muy poco probable, podría producirse intoxicación por salicilatos.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar con el médico. En ningún caso debe utilizarse sobre el pecho durante la lactancia.

Uso en niños : No se debe utilizar en niños menores de dos años.

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras : Este medicamento contiene una sustancia susceptible de producir un resultado positivo en un control de dopaje.

POSOLOGÍA:

Se debe aplicar en la zona a tratar de 1 a 3 veces al día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Emplear sobre la superficie afectada limpia y seca, en cantidad suficiente para cubrirla, aplicando el preparado con la punta de los dedos, sin frotar y procurando que no se extienda a zonas sanas. Tras la aplicación se deben lavar inmediatamente las manos, a menos que éstas estén en tratamiento.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede ocasionar inflamación, irritación, escozor, picor o descamación, pudiendo producir dermatitis si se aplica repetidamente sobre la piel.

Se han descrito casos de intoxicación cuando se ha usado en grandes superficies o a dosis muy elevadas.

La administración tópica prolongada puede producir alteraciones en la piel: atrofia, crecimiento de pelo, estrías, cambios de coloración....

CONSERVACIÓN:

Se debe mantener protegido de la luz y a temperatura inferior a 30 °C.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.