



**PROSPECTO PARA EL
PACIENTE**

**C/ Portal de Foronda 54
Vitoria-Gasteiz
01010
Tfno:945009582**

Composición (por 100 ml):

Timol	0,1 g
Alcohol de 96º	1 g
Glicerina	2 g
Agua destilada, csp	100 ml

Indicaciones:

Antiséptico bucal.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general, se utiliza dos veces al día durante el tiempo que le haya indicado su odontólogo o médico.

Vía y forma de administración:

Uso tópico bucal. No es necesario diluir el preparado en agua. Después del cepillado dental, realizar enjuagues bucales y/o gargarismos con 10 ml durante al menos 30 segundos.

Precauciones y contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

Los productos para higiene bucal no deben ser ingeridos. El timol puede producir irritación de la mucosa gástrica.

Efectos adversos:

Frecuentemente produce una sensación inicial de quemazón, sabor amargo y sequedad bucal. Ocasionalmente puede ocasionar una ligera tinción dental.

Embarazo y lactancia:

Si el medicamento se emplea de la manera indicada, no debería presentar riesgos durante estos periodos.

Conservación y caducidad:

Conservar el frasco bien cerrado en lugar fresco y seco.
Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE ALGUNA DUDA
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**



(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN