

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: **ÁLOE DE BARBADOS,
CÁPSULAS DURAS DE**

Forma farmacéutica: Cápsula

Vía de administración: Vía oral

COMPOSICIÓN:

Áloe de Barbados 50,00 mg

Excipientes

Excipiente N^o1 para cápsulas c.s.p. 1 uds

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

Este medicamento es un laxante que actúa estimulando el intestino y provocando la evacuación de las heces. Se emplea en el tratamiento de corta duración del estreñimiento ocasional.

CONTRAINDICACIONES:

No utilice este medicamento sin consultar antes con el médico si tiene dolor, retortijones o inflamación abdominal, si sufre náuseas o vómitos o si tiene alguna lesión en la zona del ano, enfermedad inflamatoria intestinal o deshidratación severa.

No utilice este medicamento para tratar el estreñimiento crónico

PRECAUCIONES:

No tome este medicamento, ni ningún otro laxante, sin consultar antes con el médico, en los siguientes casos:

-si se produce un cambio repentino en sus hábitos intestinales que no pueda explicarse por un cambio de modo de vida (como por ejemplo: un viaje, cambios en la alimentación, consumo de algunos medicamentos, etc.)

-si el estreñimiento va acompañado de dolores, fiebre o hinchazón del abdomen

Si un cambio repentino en los hábitos intestinales dura más de dos semanas debe acudir al médico.

Si después de tomar el medicamento han pasado tres días sin que se produzca la defecación o si ésta se acompaña de sangre, se debe suspender el tratamiento y acudir inmediatamente al médico.

INTERACCIONES:

A menos que el médico se lo recete, no debe utilizar este medicamento si toma diuréticos (medicamentos para orinar) o medicamentos para el corazón.

Si está usted tomando cualquier medicamento, es conveniente que antes de tomar este laxante consulte a su médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar al médico

Uso en niños : No debe administrarse este medicamento a niños menores de 12 años.

Sólo se administrará a niños mayores de 12 años, si lo receta el médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras : En ancianos deberá realizarse especial control clínico ya que el uso repetido de este medicamento puede producir una gran pérdida de electrolitos.

POSOLÓGIA:

Adultos y mayores de 12 años: debe utilizarse la dosis mínima que sea eficaz, por lo que se recomienda empezar con una cápsula al día y, si es necesario, aumentar hasta una dosis máxima de 2 cápsulas diarias en una sola toma.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Tragar las cápsulas con un vaso entero de agua. El efecto laxante se produce unas 6-12 horas después de tomar el preparado, por ello se recomienda una toma única por la noche para que el efecto se produzca por la mañana.

Duración del tratamiento: este medicamento no debe tomarse durante más de una semana sin consultar al médico.

Si después de tomar el medicamento pasan tres días (72 horas) sin que se produzca la defecación o si ésta se acompaña de sangre, se debe suspender el tratamiento y acudir inmediatamente al médico.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

Este medicamento puede producir calambres o dolores abdominales, en estos casos se debe dejar de tomar el medicamento y acudir lo antes posible al médico.

Este medicamento puede dar color pardo o rojizo en la orina pero no tiene importancia.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura inferior a 30 °C, proteger de la luz y la humedad.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.