

<b>Farmacia (Nombre)</b> <b>Calle (rellenar)</b> <b>Población y CP (rellenar)</b> <b>Teléfono (rellenar)</b>	<b>CORTICOIDE +  QUERATOLÍTICO +  ÁCIDO RETINOICO  EN EMULSIÓN O/W</b>
---	--

**Composición (por 100 g):**

Queratolítico (urea y/o ácido salicílico)	X g
Corticoide (ver anexo 1)	X g
Ácido retinoico	X g
Emulsión O/W (crema, loción),csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

**Indicaciones:**

(SE RELLENARÁ SEGÚN LA AFECCIÓN DEL PACIENTE)

**Vía y forma de administración:**

Uso tópico. Extender una capa fina sobre la zona afectada.  
No deben emplearse vendajes oclusivos salvo indicación médica.  
Después de aplicar el producto, lávese las manos salvo que éstas sean la zona a tratar.

**Posología: (\*)**

Como norma general, una aplicación diaria, preferentemente por la noche.

Respetar estrictamente la pauta de administración y duración del tratamiento prescritas por su médico. En caso de tratamiento prolongado, la supresión de éste debe ser gradual.

**Precauciones y contraindicaciones:**

Contraindicado en caso de alergia a cualquiera de los componentes.



No administrar alrededor de los ojos, nariz y boca.  
El uso simultáneo con limpiadores o jabones desecantes y/o abrasivos, puede conllevar una exfoliación excesiva.  
Evitar su empleo en heridas e infecciones cutáneas, así como sobre lunares, verrugas o marcas de nacimiento.  
No exponer la zona tratada a la luz solar o a los rayos UV, ya que puede producirse irritación.

### **Efectos adversos:**

Picor, irritación y sensación de quemazón al inicio del tratamiento.

Retrasa la cicatrización de las heridas.

La aplicación excesiva del producto puede ocasionar eritema y exfoliación muy molestos, sin aumentar la eficacia.

Fotosensibilizante. Ocasionalmente, pueden presentarse cambios de pigmentación transitorios de la piel.

Su uso prolongado puede dar lugar a atrofia cutánea.

Los efectos adversos a nivel general son infrecuentes, salvo en el caso de absorción excesiva. (Ver anexo 1)

### **Embarazo y lactancia:**

No se recomienda su uso durante estos periodos.

### **Conservación y caducidad:**

Conservar el frasco bien cerrado en lugar fresco y seco.

Caducidad: 1 mes. Desechar una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN