

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	CORTICOIDE + QUERATOLÍTICO + ÁCIDO RETINOICO EN EXCIPIENTE GRASO LAVABLE PARA CUERO CABELLUDO
---	---

Composición (por 100 g):

Queratolítico (urea y/o ácido salicílico)	X g
Corticoide (ver anexo 1)	X g
Ácido retinoico	X g
Excipiente graso lavable para cuero cabelludo, csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

Psoriasis y otras dermatitis secas localizadas en el cuero cabelludo.

Vía y forma de administración:

Uso tópico. Extender una capa fina de medicamento sobre la zona afectada, dejándolo actuar toda la noche. Retírelo al levantarse y lave el cabello con el champú complementario que le haya indicado su médico.

Es importante lavarse las manos tras la aplicación.

Posología: (*)

Como regla general se recomienda una aplicación diaria, preferentemente al acostarse, durante el tiempo establecido por el médico. En caso de tratamiento prolongado, la supresión de éste debe ser gradual.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de alergia a alguno de los componentes.



Evite el contacto con ojos, boca y mucosas.
No aplicar sobre heridas y/o infecciones cutáneas.
Después de aplicar el producto, no debe exponerse la zona a la luz solar o a los rayos UV puesto que puede provocar irritación.

Efectos adversos:

Picor, irritación y sensación de quemazón al inicio del tratamiento.

Retrasa la cicatrización de las heridas.

La aplicación excesiva del producto puede ocasionar eritema y exfoliación muy molestos, sin aumentar la eficacia.

Fotosensibilizante. Ocasionalmente, pueden presentarse cambios de pigmentación transitorios de la piel.

Su uso prolongado puede dar lugar a atrofia cutánea.

Los efectos adversos a nivel general son infrecuentes, salvo en el caso de absorción excesiva. (Ver anexo 1)

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante estos periodos.

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco.

Caducidad: 1 mes. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA, CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.