

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	CORTICOIDE + QUERATOLÍTICO EN EMULSIÓN O/W
---	---

Composición (por 100 g):

Queratolítico (urea y/o ácido salicílico)	X g
Corticoide (ver anexo 1)	X g
Excipiente emulsión O/W (crema, loción), csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

(SE RELLENARÁ SEGÚN LA AFECCIÓN CONCRETA DEL PACIENTE).

El excipiente O/W es idóneo para lesiones no especialmente hiperqueratóticas, así como para su aplicación en zonas de alta absorción como la cara, genitales y pliegues cutáneos en general, incluidas axilas e ingles. También está indicado en niños. (Véase anexo 1)

Vía y forma de administración:

Uso tópico. Extender una capa fina sobre la zona afectada. No deben emplearse vendajes oclusivos salvo indicación médica. Después de aplicar el producto, lávese las manos salvo que éstas sean la zona a tratar.

Posología: (*)

(Ver anexo 1).

Respetar estrictamente la pauta de administración y duración del tratamiento indicadas por el médico. La supresión debe ser gradual en caso de tratamientos prolongados.



Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de alergia a cualquiera de los componentes.

Debe evitarse el contacto con ojos y mucosas.

El uso simultáneo con limpiadores o jabones desecantes y/o abrasivos, puede conllevar una exfoliación excesiva.

Evitar su empleo en heridas e infecciones cutáneas, así como sobre lunares, verrugas o marcas de nacimiento.

Efectos adversos:

Pueden aparecer prurito e irritación al inicio del tratamiento.

Retrasa la cicatrización de las heridas.

Su uso prolongado puede dar lugar a atrofia cutánea.

Los efectos adversos a nivel general son infrecuentes, salvo en el caso de absorción excesiva, debida a: tratamientos demasiado prolongados, aplicaciones oclusivas y/o sobre zonas cutáneas extensas. Los ancianos y niños están más expuestos a este problema. (Ver anexo 1)

Embarazo y lactancia:

En general, se recomienda evitar el uso de corticoides en estos periodos, salvo criterio facultativo. (Ver anexo 1)

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco.

Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.