

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: ACETATO DE
HIDROCORTISONA Y FENOL, CREMA DE**

Forma farmacéutica: Crema

Vía de administración: Uso cutáneo

COMPOSICIÓN:

Hidrocortisona, acetato de	500,00 mg
Fenol	500,00 mg
Óxido de zinc	2,00 g
Mentol racémico	200,00 mg

Excipientes

Propilenglicol	c.s.p. 100 g
Emulsión O/A no iónica 2	c.s.p. 100 g

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

La hidrocortisona es un glucocorticoide con acción antiinflamatoria, antialérgica y antipruriginosa (calma el picor); el fenol tiene acción antipruriginosa y el mentol refrescante. El óxido de zinc actúa como protector de la piel y tiene también acción cicatrizante y antiséptica.

Esta crema está indicada en el tratamiento de erupciones e inflamaciones de la piel en las que se produzca picor.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en caso de alergia a los corticoides o a cualquier otro componente de la fórmula, así como en caso de infección de la zona a tratar

PRECAUCIONES:

No se debe aplicar sobre mucosas, piel erosionada o áreas extensas de la piel, porque existe riesgo de irritación cutánea y de mayor absorción; la absorción también aumenta si se aplica un vendaje oclusivo, ya que impide la ventilación de la zona. Estas precauciones deben extremarse en niños y embarazadas. Tampoco se debe utilizar alrededor de los ojos.

INTERACCIONES:

No se deben aplicar otros medicamentos en la misma zona a menos que lo haya indicado el médico

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : Durante el embarazo no debe utilizarse sobre áreas extensas de la piel, ni durante períodos prolongados, ni con vendaje oclusivo.

No se sabe si pasa a la leche materna, por lo que debe utilizarse con precaución durante la lactancia. No debe aplicarse en las mamas antes de amamantar y es preciso limpiar la zona cuidadosamente antes de dar el pecho.

Uso en niños : La aplicación en niños se realizará siempre bajo supervisión médica. Si se utiliza este medicamento en áreas extensas o durante periodos prolongados o con vendaje oclusivo o pañales existe riesgo de mayor absorción y efectos indeseables. La administración continuada en niños puede interferir con su crecimiento y desarrollo recomendándose por ello extremar la precaución en estos casos.

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras : Sustancia susceptible de producir un resultado positivo en control de dopaje.

POSOLOGÍA:

Adultos y niños mayores de 12 años: se debe aplicar 3 veces al día sobre la zona a tratar.

Niños menores de 12 años: se debe aplicar 1 ó 2 veces al día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Aplicar una fina capa sobre la zona a tratar.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

En tratamientos prolongados, se pueden producir diversas alteraciones de la piel, aumento del vello y alteraciones de la coloración de la piel. El fenol puede producir irritación en algunas pieles especialmente sensibles.

CONSERVACIÓN:

Se debe conservar a temperatura inferior a 30 °C, con el envase bien cerrado y protegido de la luz.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.