

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: IPECACUANA,
JARABE DE**

Forma farmacéutica: Jarabe

Vía de administración: Vía oral

COMPOSICIÓN:

Extracto fluido normalizado de ipecacuana	7,00 ml
<i>Excipientes</i>	
Acido clorhídrico al 0,1 N	2,50 ml
Jarabe simple	c.s.p. 100 ml

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

Inductor del vómito.

CONTRAINDICACIONES:

No se debe administrar en caso de que el paciente haya ingerido sustancias cáusticas, como lejía, o destilados del petróleo como gasolina, aceites minerales, disolventes de pinturas, etc.

No se debe administrar en niños menores de seis meses, pacientes con riesgo de ataques epilépticos, con problemas cardiovasculares, inconscientes o con peligro de coma inminente; ni en general, en aquellos casos cuyo estado aumente el riesgo de aspiración.

PRECAUCIONES:

No se puede administrar carbón activado hasta después de haber sido inducido y completado el vómito.
Su administración puede ser peligrosa en caso de intoxicación por depresores del sistema nervioso central.

INTERACCIONES:

Este medicamento interacciona con antieméticos, bebidas carbónicas, leche y derivados lácteos.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : No debe administrarse sin supervisión médica.

Uso en niños : No debe administrarse sin supervisión médica

Efectos sobre la capacidad de conducción :

Otras : No debe administrarse si el paciente está inconsciente.

POSOLOGÍA:

- Niños de 6-12 meses: 5-10 ml de jarabe de ipecacuana
- Niños de 1-12 años: 15 ml de jarabe de ipecacuana.
- Adultos y niños mayores de 12 años: 15-30 ml de jarabe de ipecacuana.

Solo en caso de no producirse el vómito se puede repetir la dosis a los 20-30 minutos y sólo una vez. Debe realizarse un lavado de estómago si tras la administración de la segunda dosis, no se produce el vómito.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

El vómito se induce tomando la cantidad indicada de jarabe, bebiendo a continuación una gran cantidad de líquidos, como agua o zumo de frutas, pero nunca leche (aproximadamente 1 litro en adultos o 15 ml/kg en niños). En niños pequeños se debe invertir el orden, administrándose primero el líquido y luego el jarabe. Se debe evitar que el paciente aspire el vómito, por lo que debe mantenerse erguido. En caso de niños pequeños se deben mantener tumbados boca abajo.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

Tiene un efecto irritante sobre el tracto gastrointestinal y pueden aparecer vómitos y diarreas con sangre. Si se absorbe la emetina, su alcaloide más importante, sobre todo si no se produce el vómito, pueden aparecer efectos tóxicos sobre el corazón y los músculos.

CONSERVACIÓN:

Se debe conservar a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la luz.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.