

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: LIDOCAÍNA
COMPUESTA, SUSPENSIÓN BUCAL DE**

Forma farmacéutica: Suspensión bucal

Vía de administración: Uso bucofaríngeo

COMPOSICIÓN:

Lidocaína, hidrocloreuro de	1,00 g
Aluminio, hidróxido de	7,00 g
Difenhidramina, hidrocloreuro de	250,00 mg
<i>Excipientes</i>	
Glicerol	10,00 g
Carmelosa sódica	1,00 g
Parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio	100,00 mg
Sacarina de sodio	100,00 mg
Menta piperita, aceite esencial de	200,00 µl
Agua purificada	c.s.p. 100 ml

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

Actúa eliminando el dolor en la zona de aplicación.
Este medicamento se utiliza en enjuagues para el tratamiento de úlceras e inflamaciones de la boca; tragado sirve para tratar las mismas afecciones en la faringe y el esófago.

CONTRAINDICACIONES:

La suspensión de lidocaína está contraindicada en pacientes con alergia a lidocaína, otros anestésicos tipo amida ó a cualquier otro componente de la fórmula.

PRECAUCIONES:

Se debe utilizar con precaución en caso de enfermedad de hígado o de riñón.

INTERACCIONES:

Hasta la fecha no se han descrito interacciones que puedan resultar peligrosas.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia :

Uso en niños :

Efectos sobre la capacidad de conducción :

Otras : No se debe sobrepasar las dosis prescritas y, es necesario, seguir rigurosamente las instrucciones de su médico o farmacéutico.

Este medicamento contiene una sustancia susceptible de producir resultado positivo en un control de dopaje.

POSOLOGÍA:

·Para alteraciones de la faringe y el esófago: enjuagar la boca con 10 ml de la suspensión y, a continuación, tragarla. Esta operación debe hacerse tres ó cuatro veces al día, con un intervalo mínimo de tres horas.

·Para alteraciones de la boca: enjuagar la boca con 30 ml de suspensión y escupirla. Pueden hacerse 3 ó 4 enjuagues diarios, según la necesidad del paciente

La dosis máxima es de 4,5 mg de lidocaína /kg/dosis, lo que para una persona de 70 kg equivale a 30 ml de suspensión.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Agitar enérgicamente la suspensión antes de usarla.

No sobrepasar las dosis prescritas.

Después de utilizar el preparado y mientras se tenga adormecida la boca, se debe esperar antes de masticar o beber (aproximadamente 20 minutos).

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

En la zona de aplicación puede aparecer sensación de quemazón.

En caso de uso prolongado o ingestión masiva se pueden producir alteraciones de la visión, mareos, escalofríos, etc.; en este caso debe acudir a su médico. Puede producir reacciones alérgicas.

CONSERVACIÓN:

Se debe conservar a temperatura inferior a 30 °C.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o la fecha de caducidad indicada en el envase.