

## PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: METRONIDAZOL,  
GEL DE**

***Forma farmacéutica: Gel***

***Vía de administración: Uso cutáneo***

### **COMPOSICIÓN:**

Metronidazol	1,00 g
<i>Excipientes</i>	
Propilenglicol	c.s.p. 100 g
Gel neutro	c.s.p. 100 g

### **ACTIVIDAD-INDICACIONES:**

El metronidazol es un antiinfeccioso que se utiliza para tratar el acné rosácea.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad al metronidazol o a cualquier ingrediente de la fórmula.

### **PRECAUCIONES:**

Dado que el metronidazol se absorbe y pasa a la sangre, el médico debe valorar la necesidad del uso del metronidazol en forma tópica en personas con antecedentes de alteraciones sanguíneas o hepáticas, por lo que, si se ha padecido algún tipo de trastorno de la sangre o del hígado, debe comunicarlo al médico antes de empezar el tratamiento.

Evite el contacto con los ojos.

### **INTERACCIONES:**

Al ser de aplicación tópica las interacciones con otros medicamentos son poco probables, de todas formas si está tomando anticoagulantes debe informar al médico antes de utilizar este gel.

No deben utilizarse otros medicamentos en la misma zona, salvo que lo haya prescrito el médico.

### **ADVERTENCIAS:**

**Embarazo y lactancia :** No se recomienda su uso en embarazo y lactancia.

**Uso en niños :**

**Efectos sobre la capacidad de conducción :** Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

**Otras :**

**POSOLOGÍA:**

Aplíquese en la lesión dos veces al día por la mañana y por la noche. La duración máxima del tratamiento es de dos meses.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Lave cuidadosamente la zona con un jabón no irritante y después de secar aplique una fina capa de gel en la zona afectada.

**SOBREDOSIS:**

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad como erupción cutánea, picor, o enrojecimiento leve y sequedad moderada de la piel.

**CONSERVACIÓN:**

Es preciso conservarlo a temperatura inferior a 30 °C.

**CADUCIDAD:**

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.