

<b>Farmacia (Nombre)</b> <b>Calle (rellenar)</b> <b>Población y CP (rellenar)</b> <b>Teléfono (rellenar)</b>	<b>PODOFILINO 20%</b> <b>POMADA</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**Composición (por 100 g):**

Podofilino	20 g
Aceite de linaza	20 g
Lanolina	60 g

**Indicaciones:**

Verrugas, papilomas.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

Como norma general, se recomienda una aplicación semanal durante 4 semanas.

**Vía y forma de administración:**

Uso tópico. Lavar la zona con agua y jabón. Aplicar el producto cuidadosamente sobre la verruga evitando el contacto con la piel sana. Únicamente se debe tratar una superficie de piel reducida o un pequeño número de verrugas en cada aplicación. Lavarse las manos inmediatamente después de su uso. Mantener durante un periodo de 1 a 6 horas y a continuación lavar con agua y jabón.

**Precauciones y contraindicaciones:**

Contraindicado en caso de alergia a cualquiera de los componentes.

Aplicar bajo estricto control médico.

Es importante manejar cuidadosamente este producto, por ser altamente irritante para la piel, ojos y mucosas.



No aplicar sobre áreas extensas por su posible absorción. Asimismo, evitar su empleo en abrasiones y heridas abiertas. Puede producir erosión grave en la piel sana que rodea a la verruga, por lo que deberá aplicarse con cuidado.

### **Efectos adversos:**

Es frecuente que produzca irritación en la piel y en ocasiones incluso sangrado.

Si se aplica en zonas extensas y/o se absorbe de forma excesiva, puede causar toxicidad sistémica grave. Los síntomas son náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

### **Niños:**

No debe administrarse en niños.

### **Embarazo y lactancia:**

Contraindicado su uso en embarazo y lactancia ya que puede atravesar la barrera placentaria y también pasar a la leche materna.

### **Conservación y caducidad:**

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco y protegido de la luz.

Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.