

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: **POVIDONA IODADA,**
SOLUCIÓN DE

Forma farmacéutica: Solución cutánea

Vía de administración: Uso cutáneo

COMPOSICIÓN:

Povidona iodada	10,00 g
<i>Excipientes</i>	
Disolución tampón fosfato a pH 6,00	c.s.p. 100 ml

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

La povidona iodada es un antiséptico con acción contra un gran número de agentes infecciosos; el responsable del efecto antiséptico es el yodo que libera este compuesto. La dilución favorece la liberación de yodo.

Este medicamento se utiliza en pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves y rozaduras.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en casos de hipersensibilidad al yodo

PRECAUCIONES:

Debe evitarse el uso regular o prolongado de este medicamento, especialmente en pacientes con quemaduras extensas, trastornos del tiroides, embarazadas y pacientes en tratamiento con litio.

En los casos en que sea necesario un tratamiento prolongado deberán realizarse pruebas de tiroides.

Se debe evitar el contacto con ojos y oídos. Para su empleo sobre mucosas se debe utilizar diluido.

INTERACCIONES:

No se debe administrar este medicamento al mismo tiempo que otros desinfectantes, especialmente si contienen mercurio, ya que éste con el yodo forma compuestos irritantes.

Se debe evitar el uso prolongado de este medicamento en pacientes que estén en tratamiento con litio

Este medicamento puede alterar los resultados de las pruebas de sangre oculta en heces y orina y, debido a la absorción del yodo, de

función tiroidea. Si van a realizarle dichas pruebas, debe advertir al médico de que lo está utilizando.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : Debe evitarse su uso en zonas extensas o durante tiempo prolongado, sin antes consultar con el médico.

Uso en niños :

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras :

POSOLOGÍA:

Se debe aplicar 1-3 veces al día directamente sobre el área afectada.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Debe aplicarse sobre la piel limpia y seca

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

En raras ocasiones se puede producir irritación local, picor o escozor, en cuyo caso se debe suspender la aplicación.

Su aplicación sobre quemaduras graves, zonas extensas, heridas grandes o durante mucho tiempo, puede producir efectos adversos más graves por la absorción de iodo.

CONSERVACIÓN:

Es preciso conservar en recipiente herméticamente cerrado y protegido de la luz.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.