

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	SOLUCIÓN DE FOSFATOS PARA PREMATUROS
---	--

Composición (por 100 ml):

Fosfato monosódico dihidratado	7,8 g
Fosfato monopotásico anhidro	6,8 g
Agua destilada, csp	100 ml

(Potasio K⁺ = 0,5 mMol/ml, Sodio Na⁺ = 0,5 mMol/ml, Fósforo P= 31 mg/ml)

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES. SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

Hipofosfatemia en prematuros.

Vía y forma de administración:

Vía oral. Medir el volumen exacto (según prescripción médica) con una jeringa limpia y administrar directamente en la boca del niño con la jeringa o con una cucharita. Si se desea puede diluirse con agua.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general, se suelen administrar entre 0,3 y 0,5 ml cada 24 horas.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.



No debe emplearse en pacientes con insuficiencia renal, cirrosis hepática, hipocalcemia, enfermedad de Adison e hiperpotasemia.

Evitar el uso simultáneo de antiácidos que contengan aluminio o magnesio.

Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.

Efectos adversos:

Pueden producirse alteraciones gastrointestinales como náuseas y diarrea.

Conservación y caducidad:

Conservar en frigorífico. Mantenga el envase bien cerrado.

Caducidad: 15 días. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.