

<b>Farmacia (Nombre)</b> <b>Calle (rellenar)</b> <b>Población y CP (rellenar)</b> <b>Teléfono (rellenar)</b>	<b>SOLUCIÓN DE LUGOL</b>
---	--------------------------

**Composición (por 100 ml):**

Iodo	5 g
Ioduro potásico	10 g
Agua destilada, csp	100 ml

(Cada ml contiene 130 mg de Iodo total )

**Indicaciones:**

Tratamiento preoperatorio del tiroides.

**Vía y forma de administración:**

Vía oral. Medir el volumen exacto de la solución con una jeringa limpia. Diluir con agua o leche, inmediatamente antes de su administración.

Se aconseja su toma conjunta con alimentos para minimizar la irritación gastrointestinal.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

Como norma general, se administran de 0,1 a 0,3 ml tres veces al día, durante 10-14 días, antes de la intervención.

**Precauciones y contraindicaciones:**

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al yodo.

Usar con precaución en niños.

Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.



**Efectos adversos:**

En tratamientos prolongados puede aparecer iodismo.

**Embarazo y lactancia:**

Contraindicado durante el embarazo y lactancia.

**Conservación y caducidad:**

Conservar en lugar fresco y seco. Mantenga el envase bien cerrado.

Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.