

<b>Farmacia (Nombre)</b>	<b>VASELINA SALICÍLICA AL 10%</b>
<b>Calle (rellenar)</b>	
<b>Población y CP (rellenar)</b>	
<b>Teléfono (rellenar)</b>	

**Composición (por 100 g):**

Ácido salicílico	10 g
Vaselina líquida	10 ml
Vaselina filante, csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

**Indicaciones:**

Tratamiento de hiperqueratosis.

**Vía y forma de administración:**

Uso tópico. Extender una capa fina del producto sobre la zona afectada, efectuando un ligero masaje.

Después de aplicar el producto, lávese las manos salvo que éstas sean la zona a tratar.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

Como norma general aplicar la pomada 1 ó 2 veces al día durante el tiempo indicado por el médico.

**Precauciones y contraindicaciones:**

Contraindicado en caso de alergia a salicilatos.

Contraindicado su uso en extremidades de diabéticos o en pacientes con insuficiencia venosa.

No aplicar en zonas extensas del cuerpo, ni sobre piel inflamada y/o lesionada, ni en períodos prolongados, especialmente en niños.

Evitar el contacto con los ojos.



**Efectos adversos:**

Ocasionalmente puede producir irritación de la piel y dermatitis.

**Embarazo y lactancia:**

Si el medicamento se emplea de la manera indicada, no debería presentar riesgos durante el embarazo.

No se recomienda su uso durante la lactancia.

**Conservación y caducidad:**

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco y protegido de la luz.

Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.